

MSMA BROMETAN

Concentrado soluble

Composición

MSMA (metanoarsonato ácido monosódico)*	96 g
Inertes y coadyuvantes c.s.p.	100 cm ³

*Arsénico total soluble en agua (Arsénico elemental) 44 g

Generalidades

MSMA BROMETAN® es un herbicida que se aplica en posemergencias de malezas y está indicado para el control de Sorgo de Alepo y otras malezas que se indican en el cuadro de recomendaciones de uso en cultivos de caña de azúcar, arveja y algodón.

Actúa por contacto, no teniendo acción pre-emergencia. En contacto con el suelo, se descompone rápidamente, no dejando por lo tanto residuos tóxicos en el mismo.

Preparación, equipos, volúmenes y técnicas de aplicación

Preparación	Agregar la cantidad necesaria del producto al tanque conteniendo agua y con el agitador de marcha. MSMA BROMETAN® se disuelve fácilmente en agua: se aconseja que la misma sea dulce y limpia.
Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación	MSMA BROMETAN® se aplica al suelo con equipos convencionales, pudiendo también aplicarse a mochila. Las pulverizaciones deberán arrojar un volumen mínimo de 400 a 600 lts./ha. procurando mojar lo menos posible el cultivo durante las mismas. Deben usarse equipos con buena agitación y picos tipo abanico. Se recomienda efectuar los tratamientos con temperaturas superiores a 20°C y en condiciones de buena luminosidad.

Recomendaciones de uso

Cultivo	Dosis	Momento de aplicación
Algodón	2,5 l/ha	Aplicar cuando las plantas tengan como mínimo 8 cm de altura, pero antes de floración. La pulverización debe ser dirigida, tratando de mojar bien las malezas, las que deberán tener 5 cm de altura. En caso de ser necesario repetir el tratamiento a los 20 días.
Caña de azúcar	2,5 l/ha	Realizar la aplicación en forma dirigida, procurando mojar bien las malezas y no las cañas.
Áreas no cultivadas	0,65-1 litros cada 100 litros de agua	Aplicar mojando completamente todo el follaje de las malezas. Si es necesario, aumentar el caudal hasta 1.500 litros de agua por hectárea. De existir rebrotes, repetir el tratamiento.
Presiembra Soja	2,5 a 3 l pf/ha	Aplicar cuando el Sorgo de Alepo tenga entre 30 y 40 cm de altura, pudiendo llegar hasta el estado de hoja bandera, usando la dosis mayor.

Malezas de combate

Capín (*Echinochloa crusgalli*), Cebollín (*Cyperus rotundus*), Sorgo de alepo (*Sorghum halepense*), Eleusine (*Eleusine indica*), Pasto miel (*Paspalum spp.*), Yuyo colorado (*Amaranthus quitensis*), Verdolaga (*Portulaca oleracea*), Cadillo (*Cenchrus spp.*), Abrojo (*Xanthium cavanillesii*), Ceba caballo.

Para el control de Cebollín y Sorgo de alepo se recomienda efectuar los tratamientos cuando la maleza se encuentre en pleno desarrollo vegetativo, repitiendo en caso necesario el tratamiento, dejando transcurrir entre 15 y 20 días.

Restricciones de uso

No presenta

Compatibilidad

MSMA BROMETAN® es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común. No debe mezclarse con compuestos fuertemente alcalinos. En caso de efectuar mezclas se recomienda realizar una prueba de compatibilidad previa en pequeña escala.

Producto inscripto en el S.E.N.A.S.A (SAG P y A) con el N° : 33.891